

## Tablas de evidencia de parto humanizado

Anexo 1A

DATOS DEL ESTUDIO	TIPO DE ESTUDIO, MUESTRA Y MUESTREO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
<p><b>AUTORES:</b> Thai Maung Maung, Nwe Oo Mon, Hedieh Mehrtash, Kwame Adu Bonsaffoh, Joshua P Vogel, Adeniyi Kolade Aderoba, Theresa Azonima Irinyenikan, Mamadou Dioulde Balde, Porjai Pattanittum, Özge Tuncalp, Meghan A Bohren.</p> <p><b>AÑO:</b> 2020.</p> <p><b>LUGAR:</b> Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria.</p> <p><b>TÍTULO:</b> Women's experiences of mistreatment during childbirth and their satisfaction with care: findings from a multicountry community-based study in four countries.</p>	<p><b>TIPO DE ESTUDIO:</b> Análisis secundario.</p> <p><b>MUESTRA:</b> 2672 mujeres que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.</p> <p><b>MUESTREO:</b> Se realizó un muestreo por conveniencia en el cual se incluyeron mujeres mayores de 15 años a las cuales se les suministró un consentimiento informado escrito, residían en un área predefinida, y proporcionaron suficiente información de contacto para hacer seguimiento. Por otro lado, se excluyeron mujeres quienes no fueron admitidas para trabajo de parto, quienes eran familiares o empleadas del centro de salud, quienes no podían proveer consentimiento razonablemente, o residían fuera del área predefinida.</p>	<p>La mayoría de mujeres estuvieron satisfechas con los servicios recibidos (n=2361/2672, 88.4%), siendo el país con mayor porcentaje Guinea (n=585/644, 90.8%), a Nigeria con el menor porcentaje de satisfacción (n=477/561, 85.0%).</p> <p>35.4% de mujeres reportaron haber sufrido de algún tipo de maltrato durante la atención de su parto, 10.7% sufrieron de violencia física y 30.7% violencia verbal</p> <p>Al 50.4% de mujeres no se le solicitó consentimiento previo a la realización de tactos vaginales, al 59.2% no se les ofreció analgesia, 16% tuvieron que esperar largos periodos para ser atendidas por personal de la salud, y con el 45.3% de mujeres no se utilizaron medidas de privacidad.</p> <p>Las mujeres con mayor nivel educativo estuvieron menos satisfechas con la atención brindada (satisfecha: n=439/2359, 18.6%; no satisfecha:</p>	<p><b>PERTINENCIA CLÍNICA:</b> Ofrece una perspectiva sobre la violencia obstétrica presentada en instituciones de salud en 4 países y, por consiguiente, el grado de satisfacción de las participantes en el estudio y si recomendarían el establecimiento para la atención de parto.</p> <p><b>LIMITACIONES:</b> El estudio fue realizado en instituciones de segundo y tercer nivel de atención por lo que es posible que los resultados no sean aplicables para instituciones de mayor nivel de complejidad.</p> <p><b>CONFLICTO DE INTERÉS:</b> No aplica</p>

		<p>n=90/304, 29.6%), mientras que aquellas con un menor nivel educativo estuvieron más satisfechas (satisfecha: n=673/2359, 28.5%; no satisfecha: n=66/304, 21.7%).</p> <p>Un total de 89.3% de mujeres (n=2385/2672) recomendarían la institución, desde Nigeria con 92% (n=516/561) hasta Ghana con un 86.9% (n=727/836).</p> <p>Las mujeres que no experimentaron violencia verbal/física o en cualquier otra forma, eran más probables de estar satisfechas con la atención recibida (AOR 4.25, 95% CI 3.27 a 5.50). De igual manera, dichas mujeres eran 4.4 veces más probables de recomendar la institución, comparado con aquellas que sufrieron de violencia verbal (AOR 4.40, 95% CI 3.38 a 5.72)</p>	
--	--	---	--